

**DICHIARAZIONE ANAMNESTICA  
PER USO DEI MEZZI DI CONTRASTO IODATI PER VIA INIETTIVA**

SI DICHIARA CHE il/la Sig./Sig.ra .....

nato/a a..... il .....

**NON PRESENTA I SEGUENTI PARTICOLARI ANAMNESTICI:**

**Presenza di condizioni patologiche che possano favorire l'insorgenza di reazioni collaterali di tipo medio-grave in seguito all'introduzione di un mezzo di contrasto**

- Paraproteinemia di Waldenstrom
- Insufficienza epatica o renale grave
- Mieloma multiplo
- Stati di grave sofferenza del miocardio o di insufficienza cardiocircolatoria
- Ipertireosi
- Ipersensibilità allo iodio
- Insufficienza renale moderata o grave

**Presenza di rilievi anamnestici di natura allergica:**

- Precedenti reazioni di tipo anafilattico
- Asma bronchiale
- Dermatiti allergiche da contatto
- Reazione agli antibiotici betalattamici
- Allergia alimentare
- Altre forme atopiche

**Stato di gravidanza**

**PRESENTA I SEGUENTI PARTICOLARI ANAMNESTICI:**

**Presenza di condizioni patologiche che possano favorire l'insorgenza di reazioni collaterali di tipo medio-grave in seguito all'introduzione di un mezzo di contrasto**

- Paraproteinemia di Waldenstrom
- Insufficienza epatica o renale grave
- Mieloma multiplo
- Stati di grave sofferenza del miocardio o di insufficienza cardiocircolatoria
- Ipertireosi
- Ipersensibilità allo iodio
- Insufficienza renale moderata o grave

**Presenza di rilievi anamnestici di natura allergica:**

- Precedenti reazioni di tipo anafilattico
- Asma bronchiale
- Dermatiti allergiche da contatto
- Reazione agli antibiotici betalattamici
- Allergia alimentare
- Altre forme atopiche

**per cui si è prescritto**

|                                |                     |                             |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Cetirizina cpr 10 mg</b>    | 1 cpr la sera prima | 1 cpr la mattina dell'esame |
| <b>Betametasona cpr 0,5 mg</b> | 2 cpr la sera prima | 2 cpr la mattina dell'esame |
| <b>Ranitidina cpr 150 mg</b>   | 1 cpr la sera prima | 1 cpr la mattina dell'esame |

**Stato di gravidanza**

**N.B.:** In presenza di pazienti con sospetto clinico di patologia epatica, cardiaca, renale o mielomatosa, è indicato procedere ai seguenti accertamenti: creatininemia, elettroforesi delle sieroproteine (rapporto Kappa/Lambda) o determinazione della proteinuria di Bence Jones, transaminasemia e bilirubinemia.

E' consigliabile l'astensione dalla somministrazione di principi attivi della classe dei biguanidi nelle 48 ore precedenti e successive alla somministrazione di mezzo di contrasto per via endovasale.

Data.....

IL PAZIENTE

IL MEDICO CURANTE